

Les oreilles d'un chien de chasse

La surveillance est obligatoire



■ Emmanuel Besignor

Dr vétérinaire praticien DMV, Spécialiste français et européen de dermatologie vétérinaire
Consultant en dermatologie et allergologie

Il est important de surveiller les oreilles des chiens de chasse, surtout lorsqu'ils présentent les caractéristiques suivantes : cérumen produit en grande quantité, bouchons de poils obstruant le conduit, franges du pavillon favorisant l'accroche des végétaux, etc. Épagneuls, setters, Labrador retrievers (...) sont des races exposées aux otites.



Plus les pavillons sont poilus, plus le risque de macération dans le conduit est important.

Certaines otites se déclenchent brutalement, d'autres surviennent progressivement et évoluent dans le temps. Suivant les cas, une otite peut concerner une ou deux oreilles. Quels que soient les symptômes, une affection auriculaire doit toujours être traitée rapidement afin d'éviter qu'une otite profonde ne se développe, pouvant conduire à la surdité.

Les blessures du pavillon et les corps étrangers

Passage dans les ronces ou les barbelés, morsures entre chiens (...), les plaies du pavillon auriculaire sont fréquentes. Comme toute plaie cutanée, elles doivent être soignées en 3 étapes : tonte, nettoyage, désinfection (voir p. 22).

Si votre chien secoue soudainement et intentionnellement l'oreille, sans inflammation apparente,

un corps étranger doit être suspecté. En été, les épillets de graminées sont fréquemment retrouvés dans les conduits auriculaires. Un examen vétérinaire à l'aide d'un otoscope confirmera le diagnostic.

Les différentes formes d'otite

Une otite se manifeste d'abord par des signes de douleur : le chien tient sa tête et ses oreilles anormalement, il se frotte, se gratte, secoue la tête et devient parfois agressif. Le grattage et les mouvements de tête entraînent fréquemment des lésions des pavillons : les poils tombent, un œdème et/ou un hématome se développent.

De nombreuses causes d'otite

Pour identifier la cause de l'otite, le vétérinaire s'appuie sur l'examen du conduit auditif et du cérumen.

- Une otite est présente dans 50 % des cas de dermatite allergique ; elle est le plus souvent bilatérale.
- L'otacariose ou la « gale d'oreilles » (due à un acarien, *Otodectes cynotis*) serait responsable de 10 % des cas d'otite externe chez le chien. Ces gales auriculaires sont très contagieuses.
- Lors d'otite infectieuse, plusieurs types de bactéries (staphylocoques, streptocoques,

pseudomonas...) peuvent être isolés chez le chien. L'infection est aussi parfois liée à des levures (*Malassezia pachydermatis* ou *Candida albicans*). Les produits actifs sur tous ces germes ne sont pas les mêmes, d'où l'importance d'un diagnostic précis.

Traitement des otites

Les soins consistent à nettoyer le conduit auriculaire avec une solution détersive, antiseptique, céruminolytique et éventuellement analgésique puis à appliquer le produit de traitement prescrit par le vétérinaire. Ces opérations doivent être réalisées en douceur pour ne pas endommager le conduit.

- Maintenez le pavillon de l'oreille en position verticale et instillez le produit nettoyant dans le conduit. Massez délicatement la base de l'oreille pendant plusieurs secondes. Regardez l'aspect du produit résiduel contenant les débris dissous et renouvelez l'opération jusqu'à obtenir un liquide propre.
- Séchez soigneusement l'entrée du conduit à l'aide de papier absorbant ou de coton. Lâchez enfin la tête du chien pour qu'il puisse secouer la tête. Attendez ensuite 20-30 minutes avant d'administrer le produit de traitement.

N'instillez jamais de produit auriculaire dans le conduit si le tympan risque d'être lésé, sinon vous risquez de provoquer une otite de l'oreille moyenne. ■